

CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU
Centre du traitement microchirurgical des hernies discales

Docteur Stéphane DELAJOUX

NEUROCHIRURGIEN

75 1 70242 4

Patient : ARTAL NORBERT

Intervention : 13 février 2012

Anesthésiste : **Dr ARSLAN**

COMPTE RENDU OPERATOIRE

Diagnostic : EXERESE MICROCHIRURGICALE D'UNE HERNIE DISCALE L2-L3 DROITE – FORAMINOTOMIE – LAMINECTOMIE

Intervention :

Repérage radiologique préopératoire.

Position décubitus ventral.

Incision cutanée centrée sur l'espace L2-L3 et abord bilatéral du rachis au bistouri électrique.

Mise en place de l'écarteur autostatique puis exérèse du ligament inter-épineux à la pince gouge d'Adson.

Positionnement de l'écarteur intervertébral puis ouverture du ligament jaune à la pince Kerisson.

Mise en place du microscope opératoire. Magnification x 6. Lumière froide au Xénon.

Foraminotomie L2-L3 et laminectomie à la pince Kerisson avec ablation de l'arthrose interapophysaire postérieure.

On peut alors exposer la racine puis la récliner vers la ligne médiane à l'aide de la spatule de Kreed et découvrir une volumineuse hernie discale compressive sous ligamentaire.

Ablation totale de la hernie aux pinces à disque droites et contre-coudées.

Le fourreau dural et la racine lombaire sont alors totalement décompressés.

Hémostase des veines épidurales à la pince bipolaire et lavage au sérum physiologique bétadiné.

Fermeture musculo-aponévrotique, sous-cutanée et cutanée par un surjet intradermique résorbable rapide.

Temps opératoire : 25 mn